


# オブジーボの動向

# オプジーボ がん腫別推定売上推移




2024年度結果

薬価改定▲15%

2025年度見込み

Source: 外部データ及び自社データより推計


# 食道がん1次治療（扁平上皮がん）における新規処方シェア※の推移



※新規処方シェア 直近3ヵ月に治療を開始した患者シェア

Source: プライマリー調査結果 (2022年5月～2025年4月調査 n=150~155)

# 非小細胞肺癌1次治療における新規処方シェア※の推移




(承認前)

※新規処方シェア 直近1ヵ月に1L治療を開始した患者シェア (Driver Mutationを除く)

Source: プライマリー調査結果 (2020年11月~2025年4月調査 n=167~245)

# 非小細胞肺癌一次治療（PD-L1陰性）における治療成績

## CheckMate 9LA試験



## オプジーボ+ヤーボイ+化学療法

5年生存率


**22%**

6年生存率

**20%**

Carbone DP, et al. ESMO Open. 2025 Jun;10(6):105123

## CheckMate 227試験



## オプジーボ+ヤーボイ

5年生存率

**19%**

6年生存率

**16%**

Suresh S. Ramalingam, et al. WCLC2023#OA14.03

## CheckMate 9DW試験

	オプジーボ+ ヤーボイ	対照群 (分子標的薬)
全生存期間	23.7ヶ月	20.6ヶ月
無増悪生存期間	9.1ヶ月	9.2ヶ月
奏効率	36%	13%
奏効期間	30.4ヶ月	12.9ヶ月
3年生存率 (follow-up data)	38%	24%
ステロイド使用割合	29%*	—
治療関連死	3.6%	0.9%

\*高用量ステロイドの使用割合

Lancet. 2025 May 24;405(10492):1851-1864.